

HET HOUDEN EN KWEKEN VAN THAMNOPHISSEN, deel III:
KORTE BESCHRIJVING VAN ENKELE REGELMATIG GEÏMPOR-
TEERDE SOORTEN.

Door: N.R. Reijst, Kasteel Erensteinstraat 29,
6222 VH Maastricht.

THAMNOPHIS MARCIANUS MARCIANUS

Dit is een fraaie, helaas niet dikwijls geïmpor-
teerde soort, met een schaakbordachtig patroon van
aan elke zijde drie rijen alternerende donkere
vlekken, die dikwijls in de lengtestrepen binnen-
dringen. Kenmerkend zijn de lichte, geelachtige,
halvemaanvormige tot driehoekige vlekken aan
weerszijde van de kop, direkt achter de bek.
De lengte van deze soort bedraagt tot 50 cm. Deze
slang wordt altijd gevonden in de direkte nabij-
heid van water. Voorkomen: Kansas, Oklahoma, Texas
tot zuidoost California, voorts de aangrenzende
delen van Mexico.

THAMNOPHIS ORDINOIDES ORDINOIDES

Deze slang is zeer variabel van kleur. De rug-
streep is rood, oranje of geel. De rug is zwart,
bruin, groenachtig of blauwachtig. De buik is rood
of zwart gevlekt.
Het is een kleine soort, de gemiddelde lengte komt
niet boven de 45 cm. Voorkomen: in het noordwesten
der Verenigde Staten op Vancouver Island en op het
vaste land van Brits Columbia (Canada) zuidwaards
tot noord California.

THAMNOPHIS RADIX RADIX EN T. R. HAYDENI

Komen voor in centraal Noord Amerika, van zuid
Wisconsin en Illinois tot de Rocky Mountains en
van New Mexico tot zuid Alberta.
De lengte kan tot 1 m bedragen, gemiddeld echter
50-70 cm.

De gele streep over de flanken loopt over de 3e en 4e schubbebrij (zie fig. 1). De rugstreep kan helder geel of oranje zijn. Kenmerkend zijn de donkere vlekken tussen rug- en zijstreep, onder de zijstreep, op de lippen en zelfs op de buik.




fig. 1. Zijstreep op de 3e en 4e schubbenrij.

Deze slang is in zijn verspreidingsgebied op vele plaatsen zeer algemeen en komt vaak zelfs in en vlakbij de steden voor. Hij zoekt meestal de nabijheid van water.

THAMNOPHIS RADIX BUTLERI

Dit is een kleine soort: meestal niet langer dan 50 cm. De kop is klein, een hals is nauwelijks te onderscheiden. De kleur van de rug varieert van olijfbruin tot zwart. De tekening bestaat uit drie lengtestrepen, waarvan de zijdelingse oranje of geel zijn, terwijl die midden op de rug altijd geel is. De zijstreep loopt over de 3e schubbenrij en de aangrenzende helften van de 2e en 4e schubbenrij. Tussen de strepen vindt men soms zwarte vlekken. De buik is bleekgroen, met zwarte of grijze vlekken.

Voorkomen: Ohio, zuid Ontario, Indiana en zuidoost Wisconsin. Deze soort bewoont de open prairieachtige streken en wordt dikwijls ver van het dichtstbijzijnde open water aangetroffen.

THAMNOPHIS SAURITUS SAURITUS

Deze zeer slanke slang kan een lengte tot 75 cm bereiken. Van deze lengte wordt een relatief groot deel door de staart ingenomen, namelijk éënvierde tot éënderde deel. De drie strepen zijn fel ge-

kleurd en staan op een donkerbruine of zwarte rug. De kleur van de middenstreep kan naar oranje neigen. De buik is bleekgroen, gewoonlijk zonder vlekken.

Hij komt voor in de omgeving van water; men vindt ze zelden ver van rivieren, beken of plassen.

In volwassen toestand eet hij meestal geen regenwormen. Wel worden, naast het gewone menu van kikkers en visjes, salamanders genomen.

Voorkomen: het oosten van de Verenigde Staten: van Michigan en zuid Ontario tot zuid Maine, verder tot Georgia, Alabama en Mississippi.

THAMNOPHIS SAURITUS PROXIMUS

Dit is een fraaie, regelmatig geïmporteerde vorm van bovenstaande soort. Hij is wat forser dan de nominaatvorm. De middenstreep kan roodachtig, geel of oranje zijn. De buik is geelwit tot groenwit, meestal ongevlekt.

Het is een westelijk ras: zuid Wisconsin tot zuidoost Colorado, zuidelijk tot Louisiana, Texas en oost Mexico.

THAMNOPHIS SIRTALIS SIRTALIS

Dit is wel de meest geïmporteerde van alle soorten. Het verspreidingsgebied is zeer groot, het reikt van zuid Canada tot de Golf van Mexico, en westelijk tot Minnesota en oost-Texas.

Kleur en tekening zijn uiterst variabel. Meestal zijn er drie geelachtige lengtestrepen, waarvan er één midden over de rug loopt, de andere aan weerszijden over de flanken op de 2e en 3e schubbenrij. In plaats van geel kunnen deze strepen ook bruinachtig of blauwig zijn. De grondkleur is zwart, donkerbruin, groen of olijfgroen. Meestal is er tussen de strepen een dubbele rij alternerende zwarte vlekken, die soms zeer duidelijk zijn, en zelfs in de strepen kunnen binnendringen. Soms vindt men geheel ongestreepte exemplaren.

De gemiddelde lengte is 60-75 cm. Hij bewoont bij voorkeur de wat vochtiger plaatsen: weiden, moerassen, oevers van rivieren, plassen en beken, maar ook komt hij voor in heuvelachtig terrein en zelfs in de tuinen van buitenwijken van grote steden.

THAMNOPHIS SIRTALIS PARIETALIS

Dit ras van bovenstaande soort komt voor in centraal Noord Amerika, waar hij de prairiegebieden van Canada tot Oklahoma en Nieuw Mexico bewoont. Tussen de rugstreep en de zijstrepen staan fraaie rode vlekken, die in grootte en intensiteit kunnen variëren. Voor de rest is hij hetzelfde als de nominaatvorm, waarvan overigens nog talrijke andere ondersoorten beschreven zijn.

LITERATUUR

- Behler, J.L. & F.W. King, 1979. The Audubon Society Field Guide to North American Reptiles and Amphibians. Alfred A. Knopf, New York. pp. 1-720.
- Conant, R., 1975. A Field Guide to Reptiles and Amphibians of the United States and Canada East of the 100th Meridian. 2nd Ed. Houghton Mifflin Co., Boston. pp. I-XVIII, 1-366.
- Stebbins, R.C., 1966. A Field Guide to Western Reptiles and Amphibians. Houghton Mifflin Co., Boston. pp. I-XVI, 1-279.
- Wright, A.H. & A.A. Wright, 1970. Handbook of Snakes of the United States and Canada, Vol. I+II, 4th Pr. Comstock Publ. Ass., Ithaca. pp. I-XVIII, 1-1105.