

KWEEKRESULTATEN

Als U kweekresultaten inzendt, wilt U die dan vergezellen van de belangrijkste gegevens over het verloop van de dracht en de bevalling, het terrarium en de voorgeschiedenis van de ouderdieren. Ook niet gelukte kweken zijn belangrijk: een ander kan er zijn voordeel mee doen.

AANMELDEN VAN KWEEKRESULTATEN.

In dit nummer vindt U een iets gewijzigd kweekmeldingsformulier. Wilt U zo vriendelijk zijn om, wanneer U met slangen gekweekt heeft, het volledig ingevulde formulier naar mij toe te sturen? Per kweek één formulier s.v.p. Dit maakt het voor mij een stuk makkelijker om een overzichtelijk stukje te schrijven.

Voor het verzamelen van informatie kan ik Uw aller hulp goed gebruiken: kent U iemand die gekweekt heeft met slangen of heeft U een advertentie gelezen waarin jonge slangen worden aangeboden? Bijvoorbeeld in een lokaal blad of zo. Als U mij de naam en het adres van de kweker opgeeft, dan neem ik contact met hem/haar op.

Omdat we ook van andermans fouten kunnen leren, verzoek ik U om ook mislukte kweken door te geven (bijvoorbeeld als de jongen opeens dood gaan, of als de eieren niet uitkomen, enz.). Hoewel het voor niemand prettig is om mislukkingen bekend te maken, kan een ander (en wie weet Uzelf) er profijt van hebben, zeker als de oorzaak te achterhalen is.

Het is echt niet de bedoeling dat alleen "bijzondere" kweken gepubliceerd worden. Vergelijken van verschillende kweekcondities kan voor iedere kweker een grote hulp zijn, ook als het om "gemakkelijk" te kweken soorten gaat.

Jacqueline Donkers, Mariendaal 407, 6715 CC Ede.
Tel. 08380-20830.

Boa constrictor constrictor.

Het terrarium heeft een door de dieren te benutten ruimte van 200x90x150 cm (lxbxh). De dagtemperatuur varieert van 26 tot 32°C al naar gelang de plaats in het terrarium. De nachttemperatuur ligt op ca. 22°C. Deze temperaturen gelden voor het gehele jaar. Om de dieren tot paren aan te zetten wordt gebruik gemaakt van een variabele lichtcyclus, die overeen stemt met de lichtcyclus van onze eigen breedtegraad. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een astronomische tijd klok, die elke dag zelfstandig de daglengte een paar minuten laat verspringen. Er werd geen water verstoven om de relatieve luchtvochtigheid te verhogen, behalve tijdens de dracht van het vrouwtje, omdat zij niet meer naar beneden kwam om te drinken.

Het vrouwtje is een nakweek exemplaar van 7 jaar oud, het mannetje is een wildvang exemplaar van 6 jaar oud. Er werd door mij slechts één paring waargenomen en wel op 15 augustus 1982. Op 25 augustus at het vrouwtje nog een konijn, waarna zij verder elk aangeboden voedsel weigerde.

Op 25 april 1983 werden 26 jongen geboren plus 2 onbevuchte eieren. Eén jong had een vergroei-de ruggegraat, die zo ernstig was misvormd, dat het jong moest worden afgemaakt.

De moeder werd dezelfde avond nog gevoerd met 2 volwassen ratten. Op 19 mei 1983 vervelde zij.

De eerste vervellingen van de jongen vonden plaats tussen 9 en 13 mei, de laatste twee jongen vervelden op 5 en 7 juni. De eerste jongen begonnen op 11 mei zelfstandig halfwas muisjes te eten, de laatste op 23 mei. De jongen hadden een gemiddelde lengte van 48 cm en een gemiddeld gewicht van 61 g.

Ron Kivit, Jan Ligthartstraat 51, 1068 PB
Amsterdam.

Ede,
Geachte slangenhouder/-ster,

Ik heb vernomen dat U enige tijd geleden gekweekt hebt met
Ik zou van Uw kweek graag wat gegevens willen vermelden in de rubriek "Kweekresultaten"
van Litteratura Serpentina . Ik hoop dat U het leuk vindt hieraan mee te werken. Om
het U gemakkelijk te maken staat er hieronder een vragenlijstje, dat U met korte ant-
woorden kunt invullen. Ik hoop binnenkort het vragenlijstje ingevuld van U terug te
mogen ontvangen.

met vriendelijke groeten,

Jacqueline Donkers, Mariendaal 407,
6715 CC Ede, tel. 08380-20830.

Naam en voorletters	:	
Adres	:	
Postcode en woonplaats:		
Telefoonnummer	:	

Slechts indien
van toepassing

Grootte van het terrarium		
Dagtemperatuur		
Nachttemperatuur		
Gebruikte U een bepaalde stimulus om de dieren tot paren aan te zetten?		
Leeftijd ouderdieren		
Datum paring		
Voedselweigering van het vrouwtje tijdens dracht? Zo ja, vanaf wanneer?		
+ Datum eierleggen		
+ Aantal eieren		
+ Broedtemperatuur		
Datum geboorte jongen		
Aantal jongen		
Van welke generatie (in ge- vangenschap) zijn de jongen?		
Gewicht jongen		
Lengte jongen		
Datum 1e vervelling		
Was dwangvoeding nodig?	prooi:	
Zelfstandig eten vanaf	prooi:	
Heeft U al eerder gekweekt met dezelfde soort?		
Heeft U al eerder gekweekt met dezelfde individuën?		
Waren de omstandigheden bij de vorige keer (keren) dat U kweekte gelijk? Zo niet: wat was er anders? Geef ook aan of eerdere po- gingen mislukten, terwijl het na bepaalde veranderin- gen wel goed ging.		