

HET BELANG VAN QUARANTAINES

Peter van Baren.

Laatst werd ik geconfronteerd met een plotseling overleden slang die in goede conditie verkeerde en waarbij geen sprake was van ziekteverschijnselen. Het dier was net van eigenaar veranderd.

Na onderzoek van dit dier bleek, dat er sprake was van een infectie met een *Paramyxovirus*. Dit is een virus dat bij gezonde dieren in het lichaam aanwezig kan zijn zonder dat ze er hinder van ondervinden (de zogenaamde dragers). Dit virus kan zijn kop opsteken, nadat de dieren aan stress zijn blootgesteld, of als gezonde dieren die gevoelig zijn voor dit virus, ermee in contact komen.

Nu is dit ermee in contact komen nogal eens een probleem bij aankoop van nieuwe dieren. Het nieuwe dier kan gezond zijn en besmet worden door de al aanwezige dieren of het nieuwe dier kan de andere dieren besmetten. Juist in het laatste geval is de quarantaine van belang. Doordat het nieuwe dier meestal aan stress is blootgesteld (het vervoer en de nieuwe omgeving), vindt er vaak een opleving van de infectie plaats en gaat dit dier virussen uitscheiden en kan het ziekteverschijnselen gaan vertonen of zelfs sterven. Zou dit dier direct bij de reeds aanwezige dieren geplaatst worden, dan kan dat de dood tot gevolg hebben van alle aanwezige dieren.

De quarantaine zou de volgende maatregelen moeten omvatten:

- de dieren niet in dezelfde ruimte huisvesten als de reeds aanwezige dieren;
- het gebruik van aparte hulpmiddelen voor deze dieren (tangen etc.);
- eerst de reeds aanwezige dieren oppakken, voeren, schoonmaken etc. dan de nieuwe dieren;

- bij een andere volgorde dan hiervoor genoemd, zorgen voor het goed wassen van de handen en bij voorkeur andere kleren aantrekken;
- regelmatig de waterbakken en andere materialen goed reinigen en eventueel met een voor de dieren veilig middel desinfecteren, dan wel na desinfectie het middel verwijderen;
- tenslotte dient de quarantaineperiode lang genoeg te zijn; de dieren moeten hun 'natuurlijke' gedrag vertonen en een gezonde indruk maken. Zelf denk ik aan een periode van al gauw een maand. Hopelijk kan het bovenstaande bijdragen aan een voorspoedige en gezonde uitbreiding van de bestaande collectie dieren

NOOT VAN DE ENGELSE CORRECTOR

Persoonlijk zou ik adviseren om een zo lang mogelijke quarantaineperiode aan te houden. Als ik dieren snel bij elkaar wil zetten ga ik uit van een quarantaineperiode van drie tot vier maanden.

Als ik wildvangdieren bij nakweekdieren zet, verleng ik de quarantaineperiode voor de wildvangexemplaren tot minimaal een jaar. Ik weet dat een jaar extreem lang lijkt. Het is echter mijn ervaring dat, ondanks profylactische behandeling tegen parasieten, latente ziekten zich na maanden nog kunnen manifesteren.

Het kost maanden (en veel meer dan vier maanden) om een wildvangdier te laten acclimatiseren in gevangenschap. Waarom zou je het aan onnodige stress blootstellen totdat het dier geacclimatiseerd is? Uiteindelijk neem je zelf de besluiten, maar mijn advies zou zijn om de quarantaineperiode zo lang mogelijk te laten zijn.

Mark Wootten

