

KWEEKRESULTATEN

De rubriek 'Kweekresultaten' wordt verzorgd door Marcel Schellekens, Lange Voren 11, 5133 TM Riel. Bij hem kunt u speciale kweekmeldingsformulieren aanvragen.

* * *

Morelia spilota variegata - Ruitpython

Grootte van het terrarium: elk volwassen dier was gehuisvest in aparte helften van een terrarium met afmetingen van 120x60x75 (lxbxh). **Dag- en nachttemperatuur:** zomer 25-28°C. Gedurende half oktober tot eind januari 30°C ($\pm 2^\circ\text{C}$) (dag) en 18-20°C (nacht). Temperatuur werd geregeld door een mechanische thermostaat die gloeilampen aan- of uitschakelde. **Paringsstimulus:** Temperatuurregeling zoals beschreven. Beide dieren werden tot december gevoerd. Midden december werd de scheidingswand in het terrarium verwijderd en werd paring geconstateerd. **Leeftijd ouderdieren:** man 3-4 jaar, vrouw 5 jaar. Beide in gevangenschap geboren. **Lengte ouderdieren:** Beide ongeveer 1,5 meter. **Datum paring:** 24, 29 en 31 december 1992. **Datum eierleggen:** 7 maart 1993 (na ongeveer 74 dagen). **Aantal eieren:** 11. 9 Eieren werden door vrouw uitgedroed in eigen helft van het terrarium bij ongeveer 35°C en de andere 2 eieren (lagen buiten de windingen van het vrouwelichaam) werden kunstmatig uitgedroed in een 4 liter plastic doos op vochtige turf bij 32°C. **Datum geboorte jongen:** 28 april 1993. De 9 eieren uitgedroed door het vrouwtje kwamen na 53 dagen uit. Eén van de kunstmatig uitgedroede eieren (de ander was onbevruucht) kwam uiteindelijk uit op 18 mei 1993, 73 dagen na leggen. **Aantal jongen:** 10 (3 mannen en 7 vrouwen). **Generatie van de jongen:** F2. **Eerste vervelling:** 13 tot 14 dagen na geboorte. **Opmerkingen:** Deze soort bleek gemakkelijk te kweken te zijn met slechts één ouderpaar en ouderwetse uitrusting (Nova Slik-Stat en 60W gloeilampen). De jongen aten niet meteen vanaf het begin, maar zodra de eersten begonnen volgde ook de rest. Ze aten graag roze muizen. 8 Jongen werden verkocht, een paar werd gehouden en een ander vrouwtje werd van een andere kweker gekocht om een nieuwe kweekgroep te starten. In oktober 1993 werd de dag- en nachttemperatuur weer gereguleerd om paring te stimuleren. De jongen konden gemakkelijk gesext worden via sondering, de mannetjes 8-10 subcaudale en de vrouwtjes 2-5 subcaudale schubben diep.

Een volledig verslag van deze succesvolle kweek is verschenen in **The Herptile** vol.18, no.3, blz. 117-129. *Journal of the International Herpetological Society*.

Kevin J. Hingley, 22 Busheyfields Road, Dudley, W.Midlands, DY1 2LP, Engeland.
Mark Hemmings, 181 Russells Hall Road, Dudley, W.Midlands, DY1 2NW, Engeland.